



MECCANISMO DI AZIONE

Il recettore oculare, da un punto di vista posturale, costituisce un essenziale strumento che consente al nostro corpo di muoversi nell'ambiente che ci circonda ed alla nostra mente di apprendere.

Si distinguono così una parte esteroceettiva, che porta al cervello le informazioni di ciò che vediamo, ed una parte propioceettiva, legata in maggior parte alla muscolatura estrinseca oculare, che porta ad altre stazioni del cervello le informazioni per una correlazione con l'apparato stomatognatico, i piedi, il corpo ed è preponderante nella postura di una persona, nell'apprendimento ed in generale nell'equilibrio psicofisico verso l'ambiente.

Il collirio, approvato dai posturologi del CIES (Collegio Internazionale Studio della Statica), agisce soprattutto sulla muscolatura estrinseca oculare, ma anche in misura minore sul muscolo ciliare e quindi sui riflessi di accomodazione e convergenza. Agisce in sinergia al trattamento ortottico e posturologico, favorisce la fisiologia della stereopsi e quindi il miglioramento della funzione coordinata di entrambi gli occhi. Vi sono due componenti: una organoterapica ed una omeopatica che sviluppano una sinergia di azione che potenzia e regola l'azione di entrambi, ottenendo effetti immediati, potenti e duraturi.

Durante gli studi di ricerca è stato possibile misurare mediante la stabilometria computerizzata l'effetto ipotizzato sotto la pianta dei piedi dei soggetti.

INDICAZIONI CLINICHE

Insufficienze di convergenza sia di interesse ortottico che posturale.

Dislessia, disgrafia, discalculia, scoliosi, ernia discale, cefalea, emicrania, vertigini, cinetosi e durante la cura ortodontica.

Coadiuvante terapeutico durante il trattamento di riprogrammazione posturale globale e durante il trattamento di ortottica.

CONTROINDICAZIONI

A tutt'oggi non è stata segnalata alcuna controindicazione

USO IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO

Per quanto non siano stati osservati effetti tossici nell'animale è consigliabile non somministrare in gravidanza ed allattamento.

EFFETTI INDESIDERATI

Sono stati segnalati rari casi di allergia o intolleranza al disinfettante conservante contenuto; in tali casi sospendere la somministrazione e consultare il proprio medico.

POSOLOGIA ED USO

Una goccia 3 volte al giorno in entrambi gli occhi: mattino mezzogiorno e pomeriggio.

Si deve mettere 6 giorni alla settimana poi 1 giorno riposo.

Si consiglia di continuare la terapia fino a scomparsa della ipoconvergenza o dei sintomi associati.

Dopo l'apertura si consiglia di tenere il flacone in frigo a circa 5 gradi C.

E' suggerito l'uso PERSONALE ED EVITARE LO SCAMBIO DI PERSONA per la possibilità di trasmissione e contagio di malattie.

Non influisce sulla guida di autoveicoli.